



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Anexo V

FLUXOGRAMA V: CONDUTA EM SURTOS DE SÍNDROME GRIPAL (SG) (Ambulatórios, Emergências, Hospitais, Consultórios)

SURTO SG

DEFINIÇÃO: ocorrência de, pelo menos, **3 (três) casos** de Síndrome Gripal em ambientes fechados/restritos, com intervalo de até cinco dias entre as datas de início de sintomas.



- **Notificar a VE/ plantão;**
- Preencher a ficha de investigação de influenza pandêmico de todos os casos e encaminhar para VE;
- Realizar monitoramento diário sobre aparecimento de sinais de gravidade;
- Orientar medidas de prevenção de transmissão;
- Orientar procurar atendimento se surgir sintomas de gravidade;
- Orientar repouso no domicílio;
- Comunicar a UPA da área de abrangência e encaminhar 3 pacientes para realizar coleta para influenza A (H1N1);
- Orientar para os pacientes com fatores de risco* para maior atenção quanto a sintomas de gravidade;
- Realizar avaliação clínica criteriosa conjuntamente com a VE sobre indicação do oseltamivir para paciente com síndrome gripal que apresenta fator de risco ;

Ações de identificação e controle do surto:

- Realizar visita ao local do surto, idealmente no mesmo dia da notificação e comunicar a Vigilância Epidemiológica;
- Realizar orientações sobre prevenção da transmissão da doença;
- Solicitar a lista de todas as pessoas que trabalham ou estudam no local, e dos sintomáticos, com telefone, endereço e data do início dos sintomas;
- Solicitar a coleta para três sintomáticos (com até 7 dias de sintomas), na UPA da área de abrangência;
- Encaminhar a planilha de acompanhamento de surto e a listagem para a Vigilância Epidemiológica;

OBS: O Ministério da Saúde recomenda afastar pacientes adultos com síndrome gripal por 7 dias após início dos sintomas e crianças menores de 12 anos devem ser afastadas por 14 dias. Avaliar potencial de transmissão; por exemplo: escolas, ambientes de serviço tipo departamentos, motoristas de ônibus, etc;

* Fatores de risco para complicações por influenza

- **Idade:** inferior a 02 ou superior a 60 anos de idade;
- **Imunodepressão:** por exemplo, pacientes com câncer, em tratamento para aids ou em uso regular de medicação imunossupressora;
- **Condições crônicas:** por exemplo, hemoglobinopatias, diabetes *mellitus*; cardiopatias, pneumopatias, hepatopatias e doenças renais crônicas;
- **Gestação**
- **Avaliar Obesidade IMC > 35**