



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Anexo I

FLUXOGRAMA I: CONDUTA EM CASOS SUSPEITO DE SÍNDROME GRIPAL (SG) – SISTEMA PÚBLICO

(Ambulatórios, Emergências, Hospitais, Consultórios)

CASO SUSPEITO SG

Indivíduo com doença aguda (com duração máxima de cinco dias), apresentando febre (ainda que referida) acompanhada de tosse ou dor de garganta, na ausência de outros diagnósticos.

Apresenta fatores de risco* para complicação ou piora/persistência sintomas

- **Notificar a VE/ plantão;**
- Preencher ficha de investigação de influenza pandêmico e encaminhar para VE;
- Realizar monitoramento diário sobre aparecimento de sinais de gravidade realizado pela vigilância e UBS, retorno na UPA a critério médico;
- Orientar medidas de prevenção de transmissão;
- Orientar repouso no domicílio;
- Orientar procurar atendimento se surgir sintomas de gravidade;
- Perguntar se existem mais pessoas que freqüentam a mesma instituição (escola, serviço...) com sintomas de gripe para identificar surtos e notificar a VE caso existam 3 pessoas na mesma instituição com síndrome gripal;
- Avaliar criteriosamente casos com fatores de risco ou SG com piora ou persistência dos sintomas –possibilidade de indicação de tratamento com Oseltamivir
- OBS: Gestante – avaliar indicação de tratamento com oseltamivir,

NÃO Apresenta fatores de risco para complicação

- Orientar para procurar atendimento novamente se apresentar sintomas de gravidade;
- Orientar medidas de prevenção de transmissão;
- Orientar repouso no domicílio;
- Perguntar se existem mais pessoas que freqüentam a mesma instituição (escola, serviço...) com sintomas de gripe para identificar surtos e notificar a VE caso existam 3 pessoas na mesma instituição com SG;
- Orientar procurar atendimento se surgir sintomas de gravidade;

OBS: O Ministério da Saúde recomenda afastar pacientes adultos com síndrome gripal por 7 dias após início dos sintomas e crianças menores de 12 anos devem ser afastadas por 14 dias. Avaliar potencial de transmissão; por exemplo: escolas, ambientes de serviço tipo departamentos, motoristas de ônibus, etc;

* Fatores de risco para complicações por influenza

- **Idade:** inferior a 02 ou superior a 60 anos de idade;
- **Imunodepressão:** por exemplo, pacientes com câncer, em tratamento para aids ou em uso regular de medicação imunossupressora;
- **Condições crônicas:** por exemplo, hemoglobinopatias, diabetes *mellitus*; cardiopatias, pneumopatias, hepatopatias e doenças renais crônicas;
- **Gestação**
- **Obesidade IMC > 35**

Obs: Nos casos atendidos pelo setor privado, se necessário encaminhar para internação, pode-se encaminhá-lo diretamente para o Hospital de sua preferência ou convênio.